



ELF: märgades metsades on linnustiku tihedus suurem



BNS (Siseuudised)

08.03.2026 12:46

7000

Looduskaitse

Veemajandus

Kaitsealad

Kaitsealused liigid

TALLINN, 8. märts, BNS – Eestimaa Looduse Fondi (ELF) tehtud linnustiku eelseire näitab, et väiksema kuivendusmõjuga metsades on lindude pesitsustihedus suurem.

ELF viis eelmisel kevadel Alam-Pedja **looduskaitsealal** läbi haudelinnustiku eelseire, keskendudes Kirna ja Valmassaare soometsadele. Uuringu eesmärk oli kaardistada piirkonna linnustiku seisund enne kavandatavaid sootaastamistöid ning luua võrdlusbaas tulevasteks seireteks. ELF-i teatel osutavad seire tulemused seosele metsa **veerežiimi** ja lindude arvukuse vahel. Väikese kuivendusmõjuga aladel oli lindude pesitsustihedus keskmiselt 18 protsenti kõrgem kui tugevalt kuivendatud aladel. Kokku loendati viiel seirealal, mille kogupindala oli 218 hektarit, 46 linnuliiki ja hinnanguliselt 1088 pesitsuspaari.

Kõige suurem pesitsustihedus – 7,39 paari hektari kohta – mõõdeti Kirna1 referentsalal, mis on säilinud looduslähedasena. Tugevalt kuivendatud Valmassaare1 alal oli pesitsuspaare 2,67 hektari kohta. Välitööde käigus registreeriti mitmeid **kaitsealuseid liike**, nende seas teise kategooria liigid laanerähn ja metsis ning kolmanda kategooria liik väike-kärbsenäpp, kes pesitses peaaegu kõigil uuritud aladel.

Alam-Pedjalt leiti ootamatult arvukalt ka vainurästaid, kuigi liigi arvukus on Eestis üldiselt vähenenud. Teadlaste hinnangul võis selle põhjuseks olla eelmisel aastal jahe ja hiline kevad.

Haudelinnustiku seire Alam-Pedjal jätkub projekti LIFE-SIP **AdaptEST** raames 2030. aastani. Planeeritud on veel kaks seireringi ning Kirna1 ala jääb kogu perioodi vältel kontrollalaks, millega taastatavate alade arengut võrreldakse.

Tallinna toimetus, +372 502 5532, sise@bns.ee

Baltic News Service

Algallikas